Devoir maison 12

À rendre le au plus tard le 13/02.

Exercice 1

On considère dans cet exercice une rotation de $\mathbb{R}^3$, et on notera la base canonique $\mathcal{B}_c$. Le produit scalaire utilisé est le produit scalaire canonique.

Notons r la rotation d'axe orienté par $u \in \mathbb{R}^3$ (un vecteur unitaire) et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Rappeler la matrice de r dans une base $\mathcal{B} = (u, v, w)$ orthonormée directe et dont le premier vecteur est u . Que vaut la trace de r ?
2. On souhaite maintenant pouvoir calculer $r(X)$ pour un $X \in \mathbb{R}^3$ dont les coordonnées seront données dans $\mathcal{B}_c$.
On fixe pour le reste de l'exercice un $X \in \mathbb{R}^3$. Montrer, en utilisant les coordonnées de X dans $\mathcal{B}$, que la projection orthogonale de X sur $D = \text{Vect}(u)$ est $p_D(X) = \langle X, u \rangle u$.
3. Que peut-on dire du vecteur $X - p_D(X)$? On pourra noter $P = \text{Vect}(u)^\perp$ le plan normal à u .
4. On note $Y = X - p_D(X)$ et $Z = u \wedge Y$. En supposant de $Y \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, que dire de la base (u, Y', Z') où $Y' = \frac{Y}{\|Y\|}$ et $Z' = \frac{Z}{\|Z\|}$?
Calculer $r(Y')$
5. En déduire que $r(Y) = \cos(\theta)Y + \sin(\theta)Z$.
6. (★) Montrer que

$$r(X) = \cos(\theta)X + (1 - \cos(\theta)) \langle X, u \rangle u + \sin(\theta)u \wedge X.$$

On pourra comparer $u \wedge X$ et $u \wedge Y$.

7. Bonus : en notant $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, en déduire (éventuellement sous forme de somme) la matrice de r dans la base canonique.

Indications

1. Définition !
2. On demande de re-démontrer le cours dans un cas particulier.
- 3.
4. Utiliser les propriétés du produit vectoriel.
5. Attention au cas $Y = 0$.
6. Utiliser la linéarité de r .
- 7.