

## Table des matières

<b>I Etude de courbes : rappels</b>	<b>1</b>
I.1 Courbes dans $\mathbb{R}^2$	1
I.2 Tangentes, variations	1
I.3 Points singuliers	1
I.4 Branches infinies	1
<b>II Etude métrique</b>	<b>2</b>
II.1 Longueur d'une courbe	2
II.2 Abscisse curviligne	2
II.3 Repère de Frenet	3
II.4 Courbure	3
<b>III Enveloppe, développée</b>	<b>4</b>
III.1 Courbe développée	4
III.2 Enveloppe	5

Dans tout ce cours,  $I$  désigne un intervalle non vide et non réduit à un point.

## I Etude de courbes : rappels

### I.1 Courbes dans $\mathbb{R}^2$

#### I.1.1 Définition

Une courbe paramétrée de classe  $\mathcal{C}^k$  dans  $\mathbb{R}^2$  est une fonction  $f : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t \mapsto M(t) \end{cases}$ . Le **support** de la courbe est  $f(I)$  (l'ensemble des points  $M(t)$ , ou encore la trajectoire du point  $M$ ).

#### I.1.2 Définition

Soit  $f$  une courbe  $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$  et  $t_0 \in I$ . Si  $f'(t_0) \neq \vec{0}$ , on dit que le point  $t_0$  est régulier, sinon on dit qu'il est singulier. Si tous les points de  $f$  sont régulier,  $f$  est dite régulière.

#### I.1.3 Courbes représentatives

Soit  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $\mathcal{C}^1$  (numérique). On considère la courbe  $f : t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ \varphi(t) \end{pmatrix}$ .

Le support de  $f$  est alors  $\{ \begin{pmatrix} t \\ \varphi(t) \end{pmatrix} \mid t \in I \}$ , c'est à dire la courbe représentative de la fonction  $\varphi$  ! De plus,  $f$  est régulière.

Question subsidiaire : que dire de la courbe paramétrée  $g : t \mapsto \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ t \end{pmatrix}$  ?

## I.2 Tangentes, variations


### I.2.1 Théorème

Si  $t_0$  est un point régulier de la courbe  $f$  alors  $f$  possède une tangente en  $t_0$  dirigée par  $f'(t_0)$ .

## I.3 Points singuliers

### I.3.1 Etude locale

Suivant la parité de  $p$  et  $q$  on obtient les 4 cas suivants.




## I.4 Branches infinies

### I.4.1 Définition

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  une courbe paramétrée et  $a \in \bar{I}$ . On dit que  $f$  possède une branche infinie au voisinage de  $a$  si  $x$  et  $y$  admettent une limite en  $a$  et qu'on est dans un des cas suivant

1. Une des limite est infinie et l'autre finie : on obtient une asymptote horizontale ou verticale.
2. ces deux limites sont infinies.

- (a) Si  $\lim_a \frac{y(t)}{x(t)} = 0$  alors on dit que  $f$  possède une branche parabolique de direction  $(Ox)$ .
- (b) Si  $\lim_a \frac{y(t)}{x(t)} = \pm\infty$  alors on dit que  $f$  possède une branche parabolique de direction  $(Oy)$ .
- (c) Si  $\lim_a \frac{y(t)}{x(t)} = \alpha \in \mathbb{R}^*$  il y a deux cas
- si  $\lim_{t \rightarrow a} y(t) - \alpha x(t) = \beta \in \mathbb{R}$  alors on dit que la droite  $\mathcal{D} : y = \alpha x + \beta$  est asymptote à  $f$ .
  - sinon on dit que  $f$  admet une branche parabolique de pente  $m$ .



## II Etude métrique

### II.1 Longueur d'une courbe

#### II.1.1 Notion intuitive de longueur

Longueur de la courbe entre les points de paramètres  $t$  et  $t + dt$  est  $\approx \|f'(t)\|dt = \text{vitesse} \times \text{temps}$ . Si on intègre entre  $a$  et  $b$ , on trouve donc la longueur de la courbe entre les points de paramètres  $a$  et  $b$ .

#### II.1.2 Définition

Soient  $a, b \in I$ . On appelle longueur (algébrique) de  $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  entre les points  $a$  et  $b$  le réel  $\int_a^b \|f'(t)\|dt$ .

#### II.1.3 Exemple

- Calculer la longueur du cercle trigonométrique.
- Calculer la longueur de l'arc de la parabole  $y = x^2$  entre les abscisses 0 et 2.

### II.2 Abscisse curviligne

On considère maintenant  $f \in \mathcal{C}^k(I, \mathbb{R}^2)$  une courbe **régulière** (la vitesse ne s'annule pas), avec  $k \geq 1$ .

#### II.2.1 Définition

Soit  $t_0 \in I$ .

On appelle abscisse curviligne de  $f$  d'origine  $t_0$  la fonction  $s : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{R} \\ t & \mapsto \int_{t_0}^t \|f'(u)\|du \end{cases}$ .

#### II.2.2 Remarque

L'information connue *a priori* sur  $s$  est la dérivée :  $\frac{ds}{dt} = \|f'\|$ . Elle ne dépend pas de l'origine choisie. Dans la suite on supposera choisie une origine.

#### II.2.3 Proposition

On considère une courbe régulière  $f$  de classe  $\mathcal{C}^k$ .

L'abscisse curviligne d'origine  $t_0$  est un  $\mathcal{C}^k$  difféomorphisme de  $I$  sur son image, c'est à dire que c'est une bijection  $\mathcal{C}^k$  dont la réciproque est  $\mathcal{C}^k$ .

#### Preuve.

Rappelons que l'application  $N : (x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ .

Ainsi  $g : t \mapsto \|f'(t)\|$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$  sur  $I$  car  $f'$  ne s'annule pas. On a même  $\forall t \in I \ g(t) > 0$ .

De plus,  $s : t \mapsto \int_{t_0}^t g(u)du$  est la primitive de  $g$  qui s'annule en  $t_0$  et est donc de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ . Comme  $s' = g > 0$ ,  $s$  est strictement croissante et  $s : I \rightarrow s(I)$  est bien une bijection.

Comme  $s'$  ne s'annule pas,  $s^{-1}$  est également de classe  $\mathcal{C}^k$ . Pour mémoire, on a  $\forall x \in s(I) \ (s^{-1})'(x) = \frac{1}{s'(s^{-1}(x))}$ . ■

#### II.2.4 Paramétrage par l'abscisse curviligne

Notons  $J = s(I)$ . Le résultat précédent permet de définir une nouvelle courbe de même support  $g : \begin{cases} J & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ u & \mapsto f(s^{-1}(u)) \end{cases}$ . On a en fait changé la manière de parcourir la même

trajectoire, et on obtient immédiatement  $\left\| \frac{dg}{du} \right\| = 1$  (paramétrage normal). Remarquons que  $u = s(t) \Rightarrow g(u) = f(t)$ .

### II.2.5 Notation

Cette dernière relation est classiquement notée  $\left\| \frac{df}{ds} \right\| = 1$ , pour indiquer que le paramétrage choisi est celui par l'abscisse curviligne. On a maintenant  $\frac{df}{ds} = \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds} = f' \times \frac{1}{\|f'\|}$ .


Si on paramètre  $f$  par  $s$ , on repère en fait les points de la trajectoire non plus par le temps de parcours, mais par la distance depuis l'origine. Il semble cohérent que le vecteur vitesse soit de norme 1.

## II.3 Repère de Frenet

### II.3.1 Définition

Soit  $t \in I$ . On note  $\vec{T}(t) = \frac{f'(t)}{\|f'(t)\|}$  (vecteur unitaire tangent de  $f$  en  $t$ ) et  $\vec{N}(t)$  (vecteur unitaire normal de  $f$  en  $t$ ) le vecteur unitaire directement orthogonal à  $\vec{T}(t)$ .

Le repère  $(f(t), \vec{T}(t), \vec{N}(t))$  est appelé repère de Frenet de  $f$  en  $t$ .



### II.3.2 Théorème (Détermination angulaire)

Il existe une fonction  $\alpha \in \mathcal{C}^{k-1}(I, \mathbb{R})$  telle que

$$\forall t \in I \quad \vec{T}(t) = \cos(\alpha(t))\vec{i} + \sin(\alpha(t))\vec{j} = \vec{u}_{\alpha(t)}.$$

Ainsi  $\alpha(t)$  est l'angle entre  $\vec{i}$  et  $\vec{T}$ .

#### Preuve.

Hors programme.

On considère la fonction  $g : I \rightarrow \mathbb{C}$  qui à  $t$  associe l'affixe de  $\vec{T}(t)$ . On a  $\|\vec{T}(t)\| = 1$  et donc  $|g(t)| = 1$ . il s'agit de montrer que  $\forall t \in I \quad g(t) = e^{i\alpha(t)}$  et que la fonction  $\alpha$  est  $\mathcal{C}^{k-1}$ . On sait que  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$ .

On a  $g\bar{g} = 1$  et en dérivant on obtient  $g'\bar{g} + g\bar{g}' = 0$ , c'est à dire que la fonction  $g'\bar{g} = \frac{g'}{g}$  (si  $|z| = 1$  alors  $\bar{z} = \frac{1}{z}$ ) est imaginaire pure.

On fixe  $t_0 \in I$ . Soit  $\theta : t \mapsto -i \int_{t_0}^t \frac{g'(t)}{g(t)} dt$ . Alors  $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$  et est de classe  $\mathcal{C}^{k-1}$


$$\text{On a alors } \left( \frac{e^{i\theta(t)}}{g(t)} \right)' = \frac{i\theta'(t)e^{i\theta(t)}g(t) - e^{i\theta(t)}g'(t)}{g^2(t)} = \frac{e^{\theta(t)}}{g^2(t)} ( \frac{g'(t)}{g(t)} g(t) - g'(t) ) = 0$$

Ainsi  $t \mapsto \frac{e^{i\theta(t)}}{g(t)}$  est une fonction constante sur l'intervalle  $I$ .

$$g(t) = Ke^{i\theta(t)}$$

avec  $g(t_0) = K = e^{ia}$  car  $|g(t_0)| = 1$  et donc  $g(t) = e^{i(a+\theta(t))}$  et  $\alpha = a + \theta \in \mathcal{C}^{k-1}$  convient ! ■

### II.3.3 Illustration



### II.3.4 Proposition

1. On a alors  $N(t) = -\sin \alpha(t)\vec{i} + \cos \alpha(t)\vec{j} = \vec{v}_{\alpha(t)}$
2. Comme  $\vec{T} = \frac{df}{ds}$ , on en déduit que  $\frac{dx}{ds} = \cos \alpha$  et  $\frac{dy}{ds} = \sin \alpha$ .

### II.3.5 Exemple

Déterminer la fonction  $t \mapsto \alpha(t)$  pour la courbe représentative de l'exponentielle.

## II.4 Courbure

### II.4.1 Définition

On appelle courbure la dérivée de la fonction  $\alpha$  par rapport à  $s$  :

$$\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$$

Comme  $\alpha$  est un angle, il n'a pas d'unité.  $\gamma$  s'exprime donc en  $m^{-1}$ .

### II.4.2 Interprétation

1. Si  $\gamma > 0$ , c'est que la détermination angulaire croît, c'est à dire que la courbe tourne vers la gauche.
2. Si  $\gamma < 0$ , c'est que la détermination angulaire décroît, c'est à dire que la courbe tourne vers la droite.
3. Si  $\gamma$  est grand en valeur absolue, c'est que  $\alpha$  change rapidement, c'est à dire que la courbe tourne "vite".

### II.4.3 Théorème (Formules de Frenet)

On a

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\vec{N} \text{ et } \frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\vec{T}$$

#### Preuve:

$$\text{On a } \frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{d\vec{T}}{d\alpha} \frac{d\alpha}{ds} = \gamma\vec{N}.$$

### II.4.4 Exemple

Calculer l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération en fonction de  $\vec{T}$ ,  $\vec{N}$ ,  $\gamma$ .

On note  $v = \|f'\|$  et  $\vec{v} = f'$ . Alors  $\vec{v} = v\vec{T}$  par définition de  $\vec{T}$ .

$$\text{De plus, } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{T} + v\frac{d\vec{T}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{T} + v^2\gamma\vec{N}.$$

### II.4.5 Exemple

1. Courbure du cercle trigonométrique :  $\gamma = 1$ .
2. Courbure de la courbe représentative de ch.

### II.4.6 Dans le repère de Frenet

Si on calcule  $[\vec{T}, \frac{d\vec{T}}{ds}]$  (produit mixte, c'est le déterminant dans le plan qui ne dépend pas du ROND choisi pour le calculer), on obtient  $\gamma$  en prenant les coordonnées dans la base de Frenet.

$$\text{Hors, } \vec{T} = \frac{1}{\|f'\|}f' \text{ et } \frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{ds}{dt}\frac{d\vec{T}}{dt} = \frac{1}{\|f'\|} \times \left( \left( \frac{1}{\|f'\|} \right)' f' + \frac{1}{\|f'\|} f'' \right).$$

Ainsi  $\gamma = [\frac{1}{\|f'\|}f', \frac{1}{\|f'\|} \times \left( \left( \frac{1}{\|f'\|} \right)' f' + \frac{1}{\|f'\|} f'' \right)] = [[\frac{1}{\|f'\|}f', [\frac{1}{\|f'\|^2}f'']] = \frac{1}{\|f'\|^3}[f', f'']$  (linéarité + caractère alterné). Finalement

$$\gamma = \left( \frac{dt}{ds} \right)^3 \left[ \frac{d\vec{OM}}{dt}, \frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \right]$$

### II.4.7 Exercice

Traduire cette formule en fonction des fonctions coordonnées  $x, y$ . Et si  $f$  est la courbe

$$t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ \varphi(t) \end{pmatrix} ?$$

## III Enveloppe, développée

### III.1 Courbe développée

#### III.1.1 Proposition

Pour une courbe  $\mathcal{C}^2$ , le point de paramètre  $t$  est birégulier ssi  $\gamma(t) \neq 0$ .

#### III.1.2 Définition

- Soit  $f \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}^2)$  une courbe birégulière (tous les points sont biréguliers). Le rayon de courbure au point  $t$  est  $R(t) = \frac{1}{\gamma(t)}$  et le centre de courbure est le point  $C(t) = M(t) + R(t)\vec{N}(t)$  ie  $\vec{MC} = R\vec{N}$ .

On peut évidemment repérer  $M$  par son abscisse curviligne et exprimer toutes les quantités en fonction de  $s$ .

#### III.1.3 Interprétation

Au point de paramètre  $t_1 \in I$ , le cercle tangent en  $\vec{T}(t_1)$  qui "ressemble" le plus à la courbe est le cercle centré en  $C(t_1)$  et de rayon  $R(t_1)$ . On l'appelle cercle de courbure en  $t_1$ .

### III.1.4 Définition

Le lieu des centres de courbure d'une courbe s'appelle la courbe développée. C'est la courbe  $t \mapsto C(t)$ .

### III.1.5 Exemple

Prenons comme courbe l'ellipse  $f : t \mapsto \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = M(t)$  sur  $[-\pi, \pi]$ . Trouvons sa courbe développée.

$f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ . Soit  $t \in [-\pi, \pi]$ .  $f'(t) = \begin{pmatrix} -2 \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}$  et donc

$$\vec{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{4 \sin^2(t) + \cos^2(t)}} \begin{pmatrix} -2 \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}.$$

Trouvons  $\gamma$ .

On a  $\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{1}{\|f'(t)\|} \frac{d\vec{T}}{dt}$

Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{T}}{ds}(t) &= \frac{1}{\sqrt{3 \sin^2(t) + 1}} \left( -\frac{1}{2} \frac{6 \cos(t) \sin(t)}{(3 \sin^2(t) + 1)^{\frac{3}{2}}} \begin{pmatrix} -2 \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{3 \sin^2(t) + 1}} \begin{pmatrix} -2 \cos(t) \\ -\sin(t) \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{(3 \sin^2(t) + 1)^2} \left( -3 \cos(t) \sin(t) \begin{pmatrix} -2 \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} + (3 \sin^2(t) + 1) \begin{pmatrix} -2 \cos(t) \\ -\sin(t) \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{(3 \sin^2(t) + 1)^2} \begin{pmatrix} 6 \cos(t) \sin^2(t) - 6 \sin^2(t) \cos(t) - 2 \cos(t) \\ -3 \cos^2(t) \sin(t) - 3 \sin^3(t) - \sin(t) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{(3 \sin^2(t) + 1)^2} \begin{pmatrix} -2 \cos(t) \\ -4 \sin(t) \end{pmatrix} = \frac{2}{(3 \sin^2(t) + 1)^{\frac{3}{2}}} \vec{N} \end{aligned}$$

Ainsi  $\gamma(t) = \frac{2}{(3 \sin^2(t) + 1)^{\frac{3}{2}}}$ .

Maintenant, le centre de courbure vérifie  $C(t) = M(t) + \frac{1}{\gamma(t)} \vec{N}(t) = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} +$

$$\frac{3 \sin^2(t) + 1}{2} \begin{pmatrix} -\cos(t) \\ -2 \sin(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cos(t) - \frac{3}{2} \cos(t) \sin^2(t) \\ -3 \sin^3(t) \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} \cos^3(t) \\ -2 \sin^3(t) \end{pmatrix}$$

et on reconnaît une astroïde.

## III.2 Enveloppe

### III.2.1 Définition

Soit  $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$  une famille de droite. On dit que  $(\mathcal{D}_t)_{t \in I}$  admet la courbe  $f : t \mapsto M(t)$  comme enveloppe ssi pour tout  $t \in I$  on a

1.  $M(t) \in \mathcal{D}_t$
2.  $\mathcal{D}_t$  est tangente à  $f$  en  $M(t)$ .

### III.2.2 Mise en équation

On se donne un points  $A(t)$  et un vecteur directeur  $\vec{u}(t)$  pour chaque droite  $\mathcal{D}_t$ . Ainsi  $\mathcal{D}_t = \{A(t) + \lambda \vec{u}(t) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))$ .

On cherche donc à écrire  $M(t) = A(t) + \lambda(t) \vec{u}(t)$  et il faut en plus que la tangente en  $M(t)$  soit dirigée par  $\vec{u}(t)$ .

On suppose les fonctions en jeu dérivables et on obtient  $\frac{d\vec{OM}}{dt} = A'(t) + \lambda'(t) \vec{u}(t) + \lambda(t) \vec{u}'(t)$ . La condition de tangence devient  $[\frac{d\vec{OM}}{dt}, \vec{u}(t)] = 0$  qui peut se récrire  $[A'(t) + \lambda(t) \vec{u}'(t), \vec{u}(t)] = 0$  (le déterminant est alterné).

### III.2.3 Proposition

Une enveloppe de la famille  $\mathcal{D}_t = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))$  est donnée par  $f : t \mapsto M(t) = A(t) + \lambda(t) \vec{u}(t)$  où  $\lambda$  est une fonction vérifiant  $[A'(t) + \lambda(t) \vec{u}'(t), \vec{u}(t)] = 0$ .

### III.2.4 Exemple

Cherchons l'enveloppe de la famille de droites  $\mathcal{D}_t : x - \cos(t)y - \sin(t) = 0, t \in [-\pi, \pi]$ .

Pour  $t \in \mathbb{R}$  on a  $\mathcal{D}_t = \begin{pmatrix} \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix} + \text{Vect}(\begin{pmatrix} \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}) = A(t) + \text{Vect}(\vec{u}(t))$ .

On cherche  $\lambda(t)$  tel que  $M(t) = A(t) + \lambda(t) \vec{u}(t)$  et vérifiant  $\det_{\mathcal{B}_e}(M'(t), \vec{u}(t)) = 0$ .

Alors la fonction  $\lambda$  vérifie  $\det(A'(t) + \lambda(t) \vec{u}'(t), \vec{u}(t)) = 0$  ie  $\begin{vmatrix} \cos(t) - \lambda(t) \sin(t) & \cos(t) \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

ou encore  $\cos(t) - \lambda(t) \sin(t) = 0$ .

Pour  $t \notin \{-\pi, 0, \pi\}$ ,  $\lambda(t) = \frac{\cos(t)}{\sin(t)}$  et on obtient  $M(t) = \begin{pmatrix} \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\cos^2(t)}{\sin(t)} \\ \frac{\sin(t)}{\cos(t)} \end{pmatrix} =$

$$\begin{pmatrix} \sin(t) + \frac{\cos^2(t)}{\sin(t)} \\ \frac{\cos(t)}{\sin(t)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin(t)} \\ \frac{\cos(t)}{\sin(t)} \end{pmatrix}.$$

On peut tracer au remarquer que tous les points de la courbe vérifient  $x^2 - y^2 = 1$ . On connaît les symétries de cette courbes qui correspondent à celles de l'enveloppe calculée.

De plus, si on prend  $x, y \geq 0$  tels que  $x^2 - y^2 = 1$  alors  $x^2 = 1 + y^2 \geq 1$  et donc  $|x| \geq 1$ . Ainsi on peut poser un  $t \in ]0, \frac{\pi}{2}]$  tel que  $\frac{1}{x} = \sin(t)$  et donc  $x = \frac{1}{\sin(t)}$ . On a alors  $y^2 = x^2 - 1 = \frac{1}{\sin^2(t)} - 1 = \frac{\cos^2(t)}{\sin^2(t)}$ . Ainsi  $y = \pm \frac{\cos(t)}{\sin(t)}$  et comme  $y \geq 0$ ,  $y = \frac{\cos(t)}{\sin(t)}$ .

Finalement, on peut paramétrer notre quart d'hyperbole pour être la courbe enveloppe calculée et le tracé est maintenant immédiat.

**III.2.5 Proposition**

Soit  $f \in \mathcal{C}^2(I, \mathbb{R}^2)$  une courbe birégulière. La courbe développée de  $f$  est également l'enveloppe de la famille  $\mathcal{D}_t = M(t) + \text{Vect}(\vec{N}(t))$  (la famille des normales).

On peut remplacer le vecteur  $\vec{N}(t)$  par n'importe quel vecteur proportionnel et non nul.

**Preuve.**

Notons  $g : s \mapsto C(s) = M(s) + R(s)\vec{N}(s)$  la courbe développée de  $f$  que l'on a paramétré par l'abscisse curviligne. Clairement chaque point de  $g$  est sur une normale.

Il reste à montrer que les normales sont tangentes à  $g$ . Or  $\frac{d\vec{OC}}{ds} = \vec{T} + \frac{dR}{ds}\vec{N} + R \times (-\gamma\vec{T}) = \frac{dR}{ds}\vec{N}$ . Ainsi les tangentes à  $g$  sont dirigées par  $\vec{N}$ . ■

**III.2.6 Exemple**

Calculons la développée de la demi-hyperbole paramétrée par  $x(t) = \text{ch}(t)$  et  $y(t) = \text{sh}(t)$  pour  $t \in \mathbb{R}$ .

On note  $f : t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$  qui est  $\mathcal{C}^\infty$ . De plus, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,  $f'(t) = \begin{pmatrix} \text{sh}(t) \\ \text{ch}(t) \end{pmatrix}$  et donc

$\vec{N}(t)$  est proportionnel à  $\vec{u}(t) = \begin{pmatrix} -\text{ch}(t) \\ \text{sh}(t) \end{pmatrix}$ .

On cherche donc une courbe notée  $M$  qui vérifie  $M(t) = \begin{pmatrix} \text{ch}(t) \\ \text{sh}(t) \end{pmatrix} + \lambda(t) \begin{pmatrix} -\text{ch}(t) \\ \text{sh}(t) \end{pmatrix}$  pour une fonction  $\lambda$  telle que  $[f'(t) + \lambda(t)\vec{u}'(t), \vec{u}(t)] = 0$ .

Cette équation peut s'écrire  $\begin{vmatrix} \text{ch}(t) - \lambda(t)\text{sh}(t) & -\text{ch}(t) \\ \text{sh}(t) + \lambda(t)\text{ch}(t) & \text{sh}(t) \end{vmatrix} = 0$  ou encore  $2\text{ch}(t)\text{sh}(t) + \lambda(t)(-\text{sh}^2(t) + \text{ch}^2(t)) = 0$  c'est à dire  $\lambda(t) = -2\text{ch}(t)\text{sh}(t)$ .

Finalement,  $M(t) = \begin{pmatrix} \text{ch}(t) + 2\text{ch}^2(t)\text{sh}(t) \\ \text{sh}(t) - 2\text{ch}(t)\text{sh}^2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{ch}(t) + 2\text{sh}(t) + 2\text{sh}^3(t) \\ \text{sh}(t) + 2\text{ch}(t) - 2\text{sh}^3(t) \end{pmatrix}$