

Table des matières

- I Rayon de convergence** 1
- I.1 Série entière 1
- I.2 Convergence d'une série entière 1
- I.3 Calcul du rayon de convergence 1
- I.4 d'Alembert 2

- II Propriétés de la somme, cas réel**
- II.1 Intégration 2
- II.2 Dérivation 2

- III Développement en série entière** 3
- III.1 Taylor 3
- III.2 Fonctions développables 3
- III.3 Développements en pratique 3

I Rayon de convergence

I.1 Série entière

Définition 1

- Une série entière de variable $z \in \mathbb{K}$ est une série de la forme $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ où $a_n \in \mathbb{C}$.
- Les termes de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont appelés les coefficients de la série entière.
- Pour chaque $z \in \mathbb{K}$ on étudie la convergence de la série numérique $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$.
L'ensemble des $z \in \mathbb{K}$ pour lesquels la série entière converge est appelé domaine de convergence.
- La somme de cette série entière est la **fonction** $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ définie sur le domaine de convergence.

Proposition 1 (Rappel)

Soit $(b_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes. $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff |b_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Définition 2

On considère deux séries entières $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n z^n$.

1. La série somme $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n + \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n z^n$ est la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n) z^n$.
2. Le produit de $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{C}$ est la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda a_n z^n$.

3. La série produit est la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} c_n z^n$ où $\forall n \in \mathbb{N} c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$

I.2 Convergence d'une série entière

Définition 3

Soit $R \in \mathbb{R}^+$. On appelle disque ouvert de centre O et de rayon R l'ensemble $D_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$.

Théorème 1 (Lemme d'Abel)

Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Supposons qu'il existe $r > 0$ tel que $(|a_n| r^n)$ est une suite bornée. Alors pour tout $z \in D_r$ (ie $|z| < r$)

$$|a_n z^n| = O_{+\infty} \left(\left(\frac{|z|}{r} \right)^n \right) \text{ et donc } \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n \text{ converge.}$$

Définition-Proposition 1

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière.

1. L'ensemble $I = \{r \in \mathbb{R}^+ \mid (|a_n| r^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}$ est un intervalle de \mathbb{R} de la forme $[0, \dots]$ (la deuxième borne est ouverte ou fermée, finie ou non)
2. $R = \sup(I) \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ est appelé **rayon de convergence** de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$

Théorème 2

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

1. Si $|z| < R$ alors la série numérique $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ converge absolument donc converge.
2. Si $|z| > R$ alors la série numérique $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ diverge grossièrement.
3. Si $|z| = R$ on ne peut pas conclure a priori sur la nature de $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$.

I.3 Calcul du rayon de convergence

Proposition 2

Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série de convergence de rayon de convergence R_a et $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_b

1. Si $a_n = O_{+\infty}(|b_n|)$ alors $R_a \geq R_b$ (un cas particulier : $a_n = o_{+\infty}(|b_n|)$).
2. Si $|a_n| \underset{+\infty}{\sim} |b_n|$ alors $R_a = R_b$.

Théorème 3

Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_a et $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_b .

1. Pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda a_n z^n$ est de rayon de convergence R_a . Le cas $\lambda = 0$ donne un rayon infini.
2. Le rayon de convergence R de la série somme vérifie $R = \min(R_a, R_b)$ si $R_a \neq R_b$ et $R \geq R_a$ dans le cas $R_a = R_b$.
3. Le rayon de convergence R de la série produit vérifie $R \geq \min(R_a, R_b)$.

Proposition 3

Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^n$ ont le même rayon de convergence.

I.4 d'Alembert**Théorème 4 (Règle de d'Alembert)**

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N} u_n > 0$. Supposons que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell$.

1. Si $\ell < 1$ alors $\sum u_n$ converge (on a même $\forall q \in]\ell, 1[u_n = o_{+\infty}(q^n)$).
2. Si $\ell > 1$ alors $\sum u_n$ diverge grossièrement (car $u_n \xrightarrow{+\infty} +\infty$).
3. Si $\ell = 1$ la série $\sum u_n$ peut être divergente ou convergente.

II Propriétés de la somme, cas réel**II.1 Intégration****Théorème 5**

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Alors f est continue sur $] - R, R[$.

Théorème 6 (Intégration terme à terme)

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ la somme d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$.

$$\forall x \in] - R, R[\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n$$

Remarquons que les séries entières qui interviennent ici sont de rayon de convergence R exactement d'après 3

Corollaire 1

Sous les mêmes hypothèses que le théorème, on peut calculer, pour $a, b \in] - R, R[$ l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt \text{ en intégrant la somme terme à terme.}$$

L'hypothèse importante est que a, b doivent être à l'intérieur de $] - R, R[$ et pas une borne de cet intervalle.

II.2 Dérivation**Théorème 7 (Dérivation terme à terme)**

Soit f la somme de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

f est dérivable sur $] - R, R[$ et pour $x \in] - R, R[$ on a

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

. Remarquons que la série entière qui définit f' est également de rayon de convergence R .

Théorème 8

Soit f la somme de la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$. Alors f est de classe \mathcal{C}^∞ sur $] - R, R[$ et les dérivées de f sont obtenues par dérivation terme à terme de la série entière, ou encore

$$\forall k \in \mathbb{N} \forall x \in] - R, R[f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+k)!}{n!} a_{n+k} x^n$$

Corollaire 2

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et f sa somme. Alors $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corollaire 3 ("Identification" (unicité) des coefficients)

Les coefficients d'une série entière de **rayon non nul** sont uniques.

Plus précisément, si $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n x^n$ sont de rayons non nuls et vérifient pour un $\alpha > 0$ que

$$\forall x \in] - \alpha, \alpha[\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

alors $\forall n \in \mathbb{N} a_n = b_n$.

III Développement en série entière

III.1 Taylor

Théorème 9 (Formule de Taylor avec reste intégral)

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$, (où I est un intervalle non vide et non réduit à un point) $a, x \in I$. Alors

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Théorème 10

Inégalité des accroissements finis Soient $a, x \in \mathbb{R}$, $a < x$ et $f \in \mathcal{C}([a, x], \mathbb{R})$. On suppose en plus que f est dérivable sur $]a, x[$.

1. Si on peut trouver $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $\forall t \in]a, x[\ m \leq f'(t) \leq M$ alors

$$m(x-a) \leq f(x) - f(a) \leq M(x-a).$$

2. Si on peut trouver $K \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall t \in]a, x[\ |f'(t)| \leq K$ alors

$$|f(x) - f(a)| \leq K|x-a|$$

qui reste vrai même quand $x < a$ (à condition de réécrire l'intervalle sous la forme $]x, a[$).

Théorème 11 (Inégalité de Taylor-Lagrange)

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I, \mathbb{R})$ (où I est un intervalle non vide et non réduit à un point) et $a, x \in I$.

On pose M_{n+1} la valeur maximale de $|f^{(n+1)}(t)|$ pour t entre a et x

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq M_{n+1} \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

III.2 Fonctions développables

Définition 4

Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^∞ sur I tel que $0 \in I$ et 0 n'est pas une borne de I . Le **développement de Taylor** de f est la série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.

Définition 5

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ où I est intervalle qui contient 0 (et 0 n'est pas une borne de I). On dit que f est **développable en série entière** (au voisinage de 0) ssi il existe $r > 0$ et une série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ tels que :

- $] -r, r[\subset I$
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ est de rayon $R \geq r$
- $\forall x \in] -r, r[\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Autrement dit, f est la somme d'une série entière sur un intervalle $] -r, r[\neq \emptyset$ contenu dans I .

La série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ est appelée **développement en série entière** de f .

III.3 Développements en pratique

Proposition 4

sin et cos sont développable en série entière sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \text{ et } \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Proposition 5

sh et ch sont développable en série entière sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\text{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \text{ et } \text{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Proposition 6

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. $f_\alpha : x \mapsto (1+x)^\alpha$ est développable en série entière sur $] -1, 1[$ et

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

Le produit qui apparaît ne comporte aucun terme lorsque $n = 0$ et donc vaut 1 par convention. **Plus généralement, le coefficient de x^n est un quotient d'un produit de n termes par $n!$.**

Si $\alpha \in \mathbb{N}$, le rayon de convergence est $+\infty$ et le développement est en fait une somme finie.