

I Frenet, courbure

Exercice 1 (Application simple de la définition)

On considère la courbe $f : t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ \text{ch}(t) \end{pmatrix}$. Calculer la longueur de la courbe entre les instants 0 et $a \in \mathbb{R}$ fixé.

Exercice 2

On considère la courbe paramétrée $f : t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ \ln(\cos(t)) \end{pmatrix}$ dont le support est la courbe est la droite d'équation $y = \ln(\cos(x))$.

1. Donner l'ensemble de définition ainsi qu'un ensemble d'étude de f .
2. Calculer en chaque point régulier le repère de Frenet.
3. Calculer la courbure en tout point régulier.
4. En déduire une expression de la courbe développée.

Exercice 3

Déterminer les courbes birégulières telles que la courbure soit proportionnelle à l'abscisse curviligne, ie vérifiant $\gamma = as$ où $a \in \mathbb{R}^*$ et s est une abscisse curviligne.

Indication : on pourra revenir, une fois n'est pas coutume, à la définition de γ et exprimer les solutions f en fonction de s .

II Enveloppes

Exercice 4

Une échelle de longueur ℓ est placée contre un mur. Si l'on fait glisser le pied de l'échelle sur le plan horizontal, elle prend dans l'espace différentes positions dont nous cherchons l'enveloppe.

1. On note A le point de contact au sol et B le point de contact au mur. Dans un repère à préciser, donner une paramétrisation des coordonnées de (AB) .
2. Déterminer l'enveloppe des droites (AB)

Exercice 5

On considère le cercle unité centré en O noté \mathcal{C} ainsi qu'une source lumineuse au point S de coordonnées $(-1, 0)$.

1. Soit $t \in]-\pi, \pi[$ et $A(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$. Donner un vecteur directeur de la droite \mathcal{D}_t portant la réflexion d'un rayon lumineux arrivant sur le cercle en $A(t)$.
2. Donner une paramétrisation de l'enveloppe des droites $(\mathcal{D}_t)_{t \in]-\pi, \pi[}$ et tracer.

Exercice 6

On considère deux points P, Q parcourant le cercle unité à des vitesses angulaires respectives de 1 et $\omega \neq \pm 1$. Calculer une représentation paramétrique de l'enveloppe des droites $\mathcal{D}_t = (P(t)Q(t))$. On pourra utiliser les nombres complexes.

Tracer pour $\omega = 3$.

Exercice 7

On considère la demi-hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = 1$ et $x \geq 0$. On paramétrise par $f : t \mapsto \begin{pmatrix} \text{ch}(t) \\ \text{sh}(t) \end{pmatrix}$ Calculer la développée en tant qu'enveloppe des normales.