

I Versions récursives

Vers le récursif

Que retourne la fonction suivante quand on l'appelle avec des entiers naturels a, b ?

```
def machin(a, b):
    resultat = a
    temp = b
    while temp > 0:
        resultat, temp = temp, resultat % temp # double assignation
    return resultat
```

Ecrire une fonction récursive qui effectue le même travail.

Rappels :

- Il s'agit de construire le résultat pour les entiers a, b connaissant le résultat du calcul pour des entiers plus petits.
- Ne pas oublier le cas d'arrêt, c'est à dire le(s) cas simple(s) pour une ou plusieurs valeurs de a, b "petite(s)".

Depuis le récursif

On considère maintenant la fonction qui prend un entier naturel n comme paramètre

```
def truc(n):
    if n <= 9:
        return [n]
    L = truc(n // 10)
    L.append(n % 10)
    return L
```

1. Simuler sur le papier un appel à `truc(513)`. Combien d'appels récursifs ?
2. Que calcule `truc(n)` ?
3. Ecrire une version itérative, avec un nom raisonnable.

II Plusieurs appels

Un petit dessin

Le but de cet exercice est d'obtenir le graphique représenté sur la figure 1. Pour cela vous disposez dans le fichier `cercles.py` de plusieurs fonctions de dessin déjà prête. Votre tâche est de remplir la fonction `cercles_rec`. Vous pourrez appeler `cercles(5)` pour tester votre fonction.




FIGURE 1 – Cercles récursifs

REMARQUE : la fonction récursive est en fait une fonction "auxiliaire" qui prend plus d'arguments que la fonction principale. cette astuce est très classique pour calculer récursivement avec plus de données.

Récursion mutuelle

Que calculent ces deux fonctions (d'argument entier naturel) ?

```
def a(n):
    if n == 0:
        return True
    else:
        return b(n - 1)
def b(n):
    if n == 0:
        return False
    else:
        return a(n - 1)
```

III Retour aux classiques

Ecrire des fonctions récursives pour :

- calculer $\binom{n}{k}$ pour $n, k \in \mathbb{N}$ avec $k \leq n$.
- calculer le maximum d'une liste de nombre. Deux indications : 1) *max* est un mot réservé, utilisez *maxi* comme nom de fonction, 2) ici on pourra utiliser une fonction récursive auxiliaires.
- calculer le nombre d'occurrence de l'élément x dans la liste L .
- calculer la liste des k -uplets de $\llbracket 1, n \rrbracket$.