

**Exercice 1**

Pour  $x \in \mathbb{R}^+$  et  $n \in \mathbb{N}$  on pose  $f_n(x) = \ln(1 + 3x + x^n)$ .

1. Montrer qu'il existe un unique réel positif  $a_n$  tel que  $f_n(a_n) = 1$ .
2. Montrer que  $0 \leq a_n \leq 1$ .
3. Calculer  $a_0, a_1, a_2$ .
4. Déterminer le signe de  $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ .
5. Etudier la convergence ainsi que l'éventuelle limite de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Exercice 2**

Montrer que l'équation  $\int_x^{f(x)} e^{t^2} dt = 1$  définit une application  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $f$  est continue. Est-elle dérivable ?

**Exercice 3**

1. Montrer que  $\forall x > 0 \arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$ .
2. En déduire la limite en  $+\infty$  de  $\frac{x}{\arctan(x)} - \frac{2}{\pi}x$ .
3. Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{x}{\arctan(nx)} dx$

**Exercice 4**

1. Montrer que  $f$ , définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$  vérifie une équation différentielle d'ordre 1.
2. Déterminer le développement en série entière de  $f$  et calculer son rayon de convergence.

**Exercice 5**

Convergence et calcul de  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{e^t + e^{-t}} dt$ .

**Exercice 6**

1. Etudier la convergence des séries de terme général  $\frac{(2n)!}{(n!)^2}$  et  $\frac{n!}{3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}$ .
2. Pour  $n \geq 2$  on pose  $U_n = \frac{1}{n}$  et  $V_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ .  
Calculer la limite de  $\frac{U_{n+1}}{U_n}$  et celle de  $\frac{V_{n+1}}{V_n}$ . Que dire de la convergence des séries correspondantes ?

**Exercice 7**

Soit  $E$  l'ensemble des fonctions continues sur  $[0, +\infty[$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , telles que  $\int_0^{+\infty} f^2(t)e^{-t} dt$  converge.

1. Pour  $a, b \in \mathbb{R}$ , montrer que  $|ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$ .

2. Montrer que  $\varphi : \begin{cases} E \times E & \rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) & \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t} dt \end{cases}$  est définie et constitue un produit scalaire.
3. On définit sur  $[0, +\infty[$  les fonctions  $L_0(x) = 1, \forall n \in \mathbb{N}^* L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^n)$ . Montrer que  $L_n$  est polynomiale de degré  $n$ .
4. Montrer que  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est orthonormale.

**Exercice 8**

Soient  $\alpha, \beta > 0$  et  $f_\alpha(x) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{t+\beta} e^{-xt} dt$ . Montrer que  $f_\alpha$  est définie sur  $\mathbb{R}_+^+$  puis montrer qu'elle y est  $\mathcal{C}^1$ .

Donner ses variations et limites aux bornes. Est-elle  $\mathcal{C}^\infty$  ?

**Exercice 9**

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$ . On considère la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{1+(na)^2}$ .

1. Etudier la convergence. La somme, quand elle existe, est notée  $h(a)$ .
2. Etudier les variations de  $h$ , puis sa limite en  $+\infty$ .
3. Prouver que

$$\forall k \in \mathbb{N} \frac{1}{1 + ((k+1)a)^2} \neq \int_k^{k+1} \frac{1}{1 + (ta)^2} \leq \frac{1}{1 + (ka)^2}$$

4. Donner un équivalent de  $h$  en 0.

**Exercice 10**

On note  $D$  l'ensemble des fonctions continues sur  $\mathbb{R}$  et telles que  $\forall p \in \mathbb{N} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^p f(x) = 0$ .

1. Donner le domaine de définition de  $F(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixt} f(x) dx$  pour  $f \in D$ .
2. Montrer que  $F$  est  $\mathcal{C}^1$  sur ce domaine et calculer  $F'$ .
3. Montrer que  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur ce domaine et calculer  $F^{(k)}$  pour  $k \in \mathbb{N}$  (on pourra s'aider d'une conjecture et procéder par récurrence).

**Exercice 11 (Mines)**

Exercice 1

1. Enoncer le théorème de dérivation sous le signe intégrale.
2. Montrer le caractère  $\mathcal{C}^1$  de  $f : x \mapsto \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(xt) dt$

3. Trouver une équation différentielle vérifiée par  $f$ .

Exercice 2

1. Etude de la conique d'équation  $2x^2 + 3xy + y^2 - 5x - 6y = 0$ .

**Exercice 12**

1. Quelle est la nature de l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt$  ?

2. Montrer que la fonction  $f(x) \mapsto \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+x} dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+^*$  et donner sa dérivée.

3. Quelle est la limite de  $f$  en  $+\infty$  ?

4. Pour aller plus loin : donner une équation différentielle vérifiée par  $f$  puis déduire une expression de  $f$ , ou encore déterminer un équivalent de  $f(x)$  en 0 ou  $+\infty$

**Exercice 13**

On définit la fonction  $f$  par  $f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \sin(t)) dt$ .

1. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $\mathbb{R}$ .

2. Montrer que  $f$  vérifie l'équation différentielle  $xy'' + y' + xy = 0$  grâce à une intégration par parties.

3. Appliquer la méthode de variation de la constante sur  $f$ .

4. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle sur  $\mathbb{R}$

**Exercice 14**  $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. Déterminer toutes les colonnes  $X$  de trois fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$  vérifiant  $X' =$

$$AX \text{ et } X(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Quelle courbe est définie par  $X$  ?

**Exercice 15 (Mines)**

Résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation  $xy' - y = \frac{x^2}{1+x^2}$ .

**Exercice 16**

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$ ,  $F_k(x) = \int_0^{+\infty} e^{-kt} \sin(xe^t) dt$ .

1. Montrer que  $F_k$  est définie et continue sur  $\mathbb{R}$ .

2. Montrer que  $F_k$  est solution de l'équation différentielle :

$$xy' - ky = -\sin(xe^t)$$

**Exercice 17**

On pose  $E = \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R})$ .

1. Montrer que  $\varphi : \begin{cases} E \times E & \rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) & \mapsto \int_0^1 (f(t)g(t) + f'(t)g'(t)) dt \end{cases}$  définit un produit scalaire sur  $E$ .

2. Soient  $V = \{f \in E \mid f(0) = f(1) = 0\}$  et  $W = \{f \in E \mid f'' = f\}$ . Montrer que  $V$  et  $W$  sont supplémentaires orthogonaux.

3. Soit  $E_{a,b} = \{f \in E \mid f(0) = a \text{ et } f(1) = b\}$ . Calculer  $\inf_{f \in E_{a,b}} (\int_0^1 (f^2 + f'^2))$ .

**Exercice 18**

Soit  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y > 0\}$  et soit  $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} & \rightarrow U \\ (t, u) & \mapsto (t + u, t - u) \end{cases}$ .

1. Montrer que  $g$  réalise une bijection de  $V = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$  sur  $U$  et qu'elle est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $V$ .

2. Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}$ . On pose  $F = f \circ g$ . Déterminer les dérivées partielles de  $f$  en fonction de celles de  $F$ .

3. On considère l'équation aux dérivées partielles :

$$(E) : \frac{2}{x+y} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{2}{x+y} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{2}{2+x+y} f = (2+x+y) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

On suppose que  $f$  est une solution de  $(E)$  sur  $U$ , de classe  $\mathcal{C}^1$ . Déterminer une équation dont  $F$  est solution.

4. Déterminer les solutions de  $(E)$  sur  $U$ .