

Table des matières

I Intégrales dépendant d'un paramètre

I.1 Cadre d'étude 1

I.2 Continuité 1

II Dérivabilité

II.1 Approche intuitive 1

II.2 Le théorème 1

I Intégrales dépendant d'un paramètre

I.1 Cadre d'étude

I.2 Continuité

Théorème 1

Soit I, J deux intervalles non triviaux de \mathbb{R} , $\varphi : \begin{cases} I \times J & \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) & \mapsto \varphi(x, t) \end{cases}$ une fonction.

Supposons que :

1. Pour $x \in I$ fixé, $\varphi_x : t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur J .
2. Pour $t \in J$ fixé, $\varphi_t : x \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur I .
3. (hypothèse de domination) Il existe $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction positive, continue et **intégrable** sur J telle que

$$\forall (x, t) \in I \times J \quad |\varphi(x, t)| \leq g(t)$$

Alors la fonction $f : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_J \varphi(x, t) dt \end{cases}$ est définie et continue sur l'intervalle I .

Proposition 1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction.

Pour $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, f est de classe \mathcal{C}^k sur I si et seulement si f est de classe \mathcal{C}^k sur tout segment $[a, b]$ inclus dans I .

II Dérivabilité

II.1 Approche intuitive

II.2 Le théorème

Théorème 2

Soit I, J deux intervalles non triviaux de \mathbb{R} , $\varphi : \begin{cases} I \times J & \rightarrow \mathbb{K} \\ (x, t) & \mapsto \varphi(x, t) \end{cases}$ une fonction.

Supposons que :

1. Pour $x \in I$ fixé, $\varphi_x : t \mapsto \varphi(x, t)$ est continue sur J et **intégrable** sur J .
2. Pour $t \in J$ fixé, $\varphi_t : x \mapsto \varphi(x, t)$ est de classe \mathcal{C}^1 sur I .
3. Pour $x \in I$ fixé, $t \mapsto \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) = \varphi'_t(x)$ est continue sur J
4. (hypothèse de domination) Il existe $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction positive, continue et **intégrable** sur J telle que

$$\forall (x, t) \in I \times J \quad \left| \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) \right| \leq g(t)$$

Alors la fonction $f : \begin{cases} I & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto \int_J \varphi(x, t) dt \end{cases}$ est définie et de classe \mathcal{C}^1 sur l'intervalle I .

De plus, pour $x \in I$

$$f'(x) = \int_J \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, t) dt$$